

令和5年版福島県農作物病害虫防除指針の変更

○令和4年11月～令和5年3月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ	作物名	農薬名	変更があった箇所	変更前	変更後	変更月日
P29		エコホープDJ	適用病害虫名「いもち病」	使用時期(収穫前日数) 「浸種前～催芽時」 ○	(空欄)	3月8日
				(空欄)	使用時期(収穫前日数) 「浸種前～催芽前」「催芽時」 ○	
			適用病害虫名「苗立枯病(リゾプス菌)」	使用時期(収穫前日数) 「浸種前～催芽時」 ○	(空欄)	
				(空欄)	使用時期(収穫前日数) 「浸種前～催芽前」「催芽時」 ○	
P30	水稲	タチガレースM液剤	有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「ヒドロキシイソキサゾール」	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内)	2月22日
		タチガレースM粉剤	有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「ヒドロキシイソキサゾール」	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内)	
		タチガレン液剤	使用時期(収穫前日数)	は種時及び発芽後	は種時又は発芽後	
			使用方法 使用時期「は種時」	土壌灌注	土壌灌注	
			使用方法 使用時期「は種時又は発芽後」	土壌灌注	土壌灌注又は灌注	
有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「ヒドロキシイソキサゾール」	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内)				
タチガレン粉剤	有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「ヒドロキシイソキサゾール」	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)	3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内)			
P46		エコホープDJ	防除方法(薬剤の種類・濃度・使用量) 対象病害虫「いもち病」 防除時期「は種前」 (2)生物農薬による防除	催芽前浸漬処理 生 エコホープDJ 200倍液・24時間	催芽前浸漬処理 生 エコホープDJ 200倍液・24～48時間	3月8日
P51			生物農薬による防除 (1)催芽前浸漬処理	ただし、エコホープDJのいもち病に対して～24時間処理のみである。	(削除)	
P71	ムギ類	イオウフロアブル	使用時期(収穫前日数)	—	発病前～発病初期	3月22日
P81	水稲	ゼータプラス1キロ粒剤	使用時期	移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	移植直後～ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで	11月9日
P101	ムギ類	トレファノサイド乳剤	使用時期	は種後出芽前 (雑草発生前)	は種後出芽前～3葉期(雑草発生前～雑草発生始期)	2月22日
			使用方法	全面土壌散布	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	
		トレファノサイド粒剤2.5	使用時期	は種後出芽前	は種後出芽前～3葉期(雑草発生前～雑草発生始期)	12月21日
			使用方法	全面土壌散布	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	
P202	キャベツ	ゼンターリ顆粒水和剤	適用病害虫名「アオムシ」	○*a	○	3月8日
			適用病害虫名「コナガ」	○*a	○	
			適用病害虫名「ヨトウムシ」	○*a	○	
			適用病害虫名「ハスモンヨトウ」	○*a	○	

令和5年版福島県農作物病害虫防除指針の変更

○令和4年11月～令和5年3月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ	作物名	農薬名	変更があった箇所	変更前	変更後	変更月日
P207	ブロッコリー	アフエットフロアブル	作物名	ブロッコリー	はなやさい類	1月11日
P213	ハクサイ	フェニックス顆粒水和剤	有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「フルベンジアミド」	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)	4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)	3月8日
P233	ニラ	アフエットフロアブル	使用時期(収穫前日数)	収穫7日前まで	収穫前日まで	2月8日
			使用回数の制限(回)	1回	2回以内	
			有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「ベンチオピラド」	1回	2回以内	
P239	レタス	フェニックス顆粒水和剤	有効成分ごとの使用回数の制限(回) 有効成分「フルベンジアミド」	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	3月8日
P257	タマネギ	グラメックス水和剤	防除時期	定植活着後(雑草発生前)但し、収穫90日前まで	定植活着後(雑草発生前)但し、収穫30日前まで	
P386	ウメ	イオウフロアブル	使用時期(収穫前日数)	—	発病前～発病初期	3月22日
P388	ネクタリン	イオウフロアブル	使用時期(収穫前日数)	—	発病前～発病初期	
P480	牧草	ハーモニーDF	濃度・使用量(希釈水量) 防除時期 「採草21日前まで(雑草生育期)」	3～5g/10a (水 100L/10a)	3～5g/10a (水 通常散布50～100L/10a、少量散布10～50L/10a)	2月22日
			濃度・使用量(希釈水量) 防除時期 「新播草地定着後(但し、採草21日前まで)」	0.5～1g/10a (水 100L/10a)	0.5～1g/10a (水 通常散布50～100L/10a、少量散布10～50L/10a)	

○令和4年11月～令和5年3月に失効した農薬

失効月日	農薬名	備考	備考欄
		該当ありません。	

注)最新の農薬登録情報を確認のうえ、農薬を使用すること。  
注)メーカーにより使用基準が異なる場合があるため、ラベルに記載されている使用方法等を確認すること。